







De preimot en preimineervlieg

De preimot en preimineervlieg leggen hun eitjes op het blad van de prei. Als de larven uit het eitje komen voeden zij zich met het blad van de plant. Zij boren gaatjes in de preischacht en dit kan leiden tot rotting.

 <p>de preimot is een vlinder uit de familie van de koolmotten</p>	 <p>schade door larve van de preimot</p>	 <p>larve van de preimot</p>
 <p>de preimineervlieg</p>	 <p>schade door larve van de preimineervlieg</p>	 <p>larve van de preimineervlieg</p>

Hoe herken je de aantasting van de preimot en preimineervlieg?

- je herkent de aantasting door het afgeraspte blad dat zich als een soort meel op het blad verzamelt.
- je ziet sleufjes in het blad;
- het blad gaat hangen
- de kans op schade is vanaf april tot oktober



Preventie.

- prei wordt vaak geplant waar eerder in het seizoen reeds planten gestaan hebben. Deze planten hebben reeds veel voedsel uit de bodem opgenomen. Vergeet daarom niet om de bodem opnieuw te bemesten. Gebruik stikstofrijke organische mest.
- giet regelmatig water in de schacht van de plant; rupsen zullen sterven.
- gebruik insectengaas over de planten; op een winderige ochtend kun je de gaas verwijderen om onkruid te wieden en de grond los te houden. De preimot is immers een nachtvlinder, en de vlieg houdt niet van wind.
- aangetaste bladeren afsnijden en in **niet** de compostbak gooien maar in de afvalcontainer.

Bestrijding.

- met Pyrethrum is een biologisch insecticide op basis van een natuurlijk plantenextract. In ieder tuincentrum verkrijgbaar.
- begieten met een zelf eenvoudig te maken gierextract van brandnetels.
- of met een mengsel van groene zeepsop met een beetje spiritus